Si les abcés qui s'ouvrent en dehors peuvent dégenerer en fistule, à plus forte raison ceux qui s'ouvrent dans l'interieur des ventres peuvent ils rester fistuleux. on a ~~voit~~ vus souvent des abcés au foye s'ouvrir dans les intestins, et se vuider par l'anus, nous en avons raporté plusieurs exemples.

on sait que des abcés qui s'ouvrent ainsi ~~[illegible]~~ il y en a qui s'evacuent et se degorgent si completement au dehors que les malades guerissent promptement et sans retour. mais il y en a d'autres qui ne se vuident qu'imparfaitement, et si les malades sont soulagé d'abord, ~~mais~~ ils ne se retablissent ~~p~~ point, la plus part meurent. Les plus robustes ~~[illegible]~~ ~~et~~ tombent en langueur, et perissent plutôt ou plus tard selon leur plus ou moins de force, et selon le plus ou le moins de facilité que le pus a de s'ecouler. enfin il y en a qui s'ecoule avec facilité, mais le foyer ne se consolide point il reste dur et devient fistuleux. ceux la vivent plus longtems et guerisent Lorsquils se trouvent dans certaines circonstances

j'ay vû un homme asés robuste qui a l'âge de cinquante ans avoit eu un apostême a l'hypocondre droit dont la matiere s'etoit vuidée, et se vuidoit depuis cinq ans, par une ouverture qu'elle s'etoit faite dans la partie droite du colon. après avoir langui jusqu'à cinquante cinq ans il mourut, je trouvay dans la cavité ~~de~~ l'arc du colon une ouverture ronde, et asés grande pour y passer le doigt. les bords de cette ouverture, et tout le foyer de l'abcés étoient extremement durs, le peritoine, l'exterieur de la

ARC 48 n°41

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE MEDECINE

vesicule du fiel, une partie de l'epiploon, et les bords ~~[illegible]~~ de la partie cave du foye adherens et confondus, et pour ainsi dire, ensemble, formoient le foyer de cette fistule.

Pendant les cinq années que le malade subsista avec cette fistule, il fut presque continuellement tourmenté de tranchées qui cessoient lorsquil avoit été à la selle, et quil avoit rendu une palette de matieres purulentes et sanieuses qui quelquefoys étoient mélées avec les excremens, et d'autrefoys en étoient fort distinctes. il avoit souvent ~~eu~~ de la fievre tantot plus tantot moins forte; il n'observa aucun regime, ne pouvant souffrir aucun aliment que les aigres comme citrons, verjus, et fruits verds; peut-être que ce regime convenoit en quelque sorte à son état; mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner cette question quoiquil en soit faute d'ecoulement complet du pus, et de la fonte des duretés et callosités du foyer, le malade tomba dans le marasme et mourut. Peut-être, pouvoit-il guerir de cette maladie l'observation suivante donne lieu de le croire;

Un homme de quarante ans me consulta pour une fistule à l'anus quil disoit avoir depuis quinze ans, il ne rendoit jamais le pus qu'en allant à la selle, et il étoit souvent difficile de le distinguer d'avec les matieres fecales aux quelles il étoit presque toujours mêlé.

Ces circonstances me firent douter quil y eut fistule à l'anus. avant de decider, je voulus observer les selles, –

et bien examiner l'Anus. la premiere chose que j'observay fut que la chemise n'étoit point gatée par le pus, sur quoi je conclus que l'ouverture de la fistule devoit être au dessus du sphincter, d'autant mieux que je ne trouvay dans l'Anus ny au dessus, tant que mon doigt pût s'étendre, aucune dureté, inegalité, ny gonflement, et par tout où je touchay, je ne causay aucune douleur au malade.

L'ecoulement du pus se suprimoit quelquefoys pendant cinq ou six jours, et alors peu à peu le malade devenoit jaune, avoit des pesanteurs, des lassitudes, de l'insomnie, de la fievre même avec frisson, et il sentoit une douleur assés vive à l'hypocondre droit; mais aussitôt que le pus reprenoit son cours par l'anus tous ses accidens disparoissent, à cela près d'un petit ressentiment de douleur qui continuoit deux ou trois jours, et quelquefoys plus longtems, lorsque l'on pressoit un peu la region du foye qui étoit toujours très-dure.

je ne doutay point que cette maladie ne fut une fistule, suite d'un abcés à la region du foye, dans lequel ce viscere étoit interessé: et ~~mais~~ une fistule dans un lieu si caché et sans doute incurable par l'operation de la main, lorsque la difficulté de la guerison ne dépend que du vice local: mais heureusement pour le malade, après l'avoir questioné, je reconnus en lui une cause interne qui avoit produit la premiere

8

Maladie, et de la qu'elle dependoit la fistule en effet ce Malade avoit la verole, je le traitay de cette maladie, et il fut parfaitement gueri de sa fistule avant la fin de son traitement, ^et peu apres dans l'espasse de deux mois il fut delivre de # je ne puis m'empecher de dire que l'on ne peut examiner trop scrupuleusement ceux qui sont attaqués de maladies croniques, sur tout lorsqu'elles succedent à une maladie aigüe. ~~et~~ △

Lecoulement purulant # durete skirreuse de l'hypochondre droit

No. 49.

H.